

# Avertissements agricoles

PUBLICATION PÉRIODIQUE  
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la D.R.A.F.  
C.C.P. Montpellier 5238-12 G

## GRANDES CULTURES SEMENCES

58M - 12 JUILLET 1990

### **LUZERNE A GRAINES - N 6**

(en collaboration avec la FNAMS et les  
SUADS de L'Aude, du Gard et de l'Hérault)

#### **PUNAISES :**

- Captures élevées localement
- Assurez votre potentiel grainier

#### **TORDEUSES :**

- Fin de vol

Une majorité de parcelles des zones les plus tardives Nord-gardoise et Est-Audoise et, celles précoupées en zones précoces cotières sont encore au stade gousses vertes, sensible à ces ravageurs des jeunes gousses.

**PUNAISES** : le seuil de 50 captures est quelquefois largement dépassé (Biterrois) on s'en approche en de nombreux secteurs.

#### **PRECONISATION**

- Surveillez vos cultures
- En toute situation non protégée depuis deux semaines, traitez à l'aide d'une spécialité contenant de l'endosulfan (1 000 g de m. a./ha)
- Intervenez en soirée en l'absence de pollinisateurs.

#### **MAIS (Hérault et Gard)**

- |              |  |
|--------------|--|
| - SESAMIE G2 | : Début de vol - risque potentiel généralisé sur la région |
| - PYRALE G1  | : Fin de vol en cage d'élevage à MONTPELLIER LE 7 juillet  |
| - ACARIENS   | : Présence localisée, mais peu de foyers déclarés          |
| - PUCERONS   | : Présence sectorielle assez forte                         |

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON  
Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal  
34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. 67 92 41 42



- **-STADE** :8-10 feuilles à sortie des panicules mâles,
- **SESAMIE** Le second vol a commencé à s'établir dans les premiers jours de juillet et la majorité des larves est en cours de nymphose. L'essentiel des pontes débutera dans les prochains jours.

**EFFECTUEZ UNE PREMIERE INTERVENTION  
ENTRE LE 16 ET LE 21 JUILLET**

Une deuxième application devra être effectuée pour la fin du vol 15 jours plus tard c'est à dire à partir du 31 JUILLET.

Enfin la précocité de l'année laisse à penser qu'une troisième génération totale ou partielle pourrait survenir. Nous vous en informerons en temps utile.

Ces traitements seront efficaces contre la 2ème génération de pyrale du maïs.

**PUCERONS-ACARIENS**

La présence de foyers d'acariens et de pucerons répartis ici ou là laisse penser qu'il existe encore dans quelques cas un risque de pullulation malgré une présence abondante de prédateurs en toutes régions.

**PRECONISATION**

Parcourez vos cultures et observez les soigneusement avant chaque traitement sésamie :

- Premier cas quelques foyers d'acariens dans parcelle habituellement attaquée ajouter CESAR au produit contre la sésamie
- Deuxième cas présence généralisée d'acariens en observant la feuille sous l'épi ajouter OMITE
- Troisième cas présence généralisée de pucerons ajouter PIRIMOR G

Produits utilisable à cette époque de l'année

SESAMIE	ACARIENS	PUCERONS
DECIS (0,81/ha)	OMITE 57 EL 2 l/ha	PIRIMOR G(0,5Kg)
SUMICIDIN (1,51/ha)	CESAR (0,25 kg/ha)	